

(二十二)
(楊贊民)

是書關於醫學名詞。皆廣爲收採。得七萬餘條。三百五十餘萬言。於病證醫方藥品。詳述無遺。即各種方法。凡足以預防生命危險者。亦無不備具。醫界得之。足爲隨證檢查之助。非醫界得之。亦可以考訂方藥。兼得延年却病之術。

中國醫藥大辭典

洋裝兩厚冊 實洋十二元

謝利
恆編

上海三馬路南路
幸福書局經售
商務印書館醫藥衛生書籍

實洋四角五分

以上門診時間
上午九時至下午四時
下午四時至六時
診所
上海南會里第一家
電話 六三九四三

掛號處啓

紹儀署

一頁一元 費在 一律 郵票 計值 目

丁惠康

薰風南來。又是溽暑天氣。一般宗教家衛生家。多實行茹素主義。而世人或惑於素食營養不足之故說。而僅於嘗試。略費數語。以申其說。此亦爲關心素食者所樂聞歟。高惠忠公曰。少殺生命。最可養心。最可惜福。一般皮肉。一般痛苦。物物不能言耳。此儒家之言也。考老人與牛羊雞鴨。豕魚蝦蟹等。皆屬動物類。立於一條平等線上。宜一律平等。人類不應自恃其聰明。以欺智識低下之動物。此社會學汪精衛李石曾吳稚暉先生等之所以戒殺。而實行素食也。佛言我觀衆生。輪迴六道。迭爲父母六親眷屬。更相啖肉。無非親者。不食肉者。即是無量功德之聚。此釋家之素食主義也。或曰。是乃迂談。是乃迷信。此反對以上之說者。其確否姑不具論。今乃專就狹義的醫學的言之。

口愛情障礙

鼻濁惡臭。鼻流涕淚。鼻常
 覺情破綻。理所當然
 挽救之策。惟保其然
 小程子心爲本。用著名之
 程致遠。平曰。終日流涕者
 春。應具其結。情未盡
 久矣。愛情破綻。求中意者
 均無效驗。福報無上。中在
 友二人。可幸。福報無上。中在
 二盒。試之。果。夫。不致
 好如初云。意想九專治。每
 大洋五角。不到之效。每盒
 不折。不扣。

於筋肉。吾人偶一不慎。取而食之。則繁殖於人類之腹中。如條虫旋毛虫等。Muscle trichinae 其尤甚者也。其症候輕者。則起各種之胃腸症。漸至全身衰弱。重者則其子虫穿貫腸壁。棲息於筋肉內。腸挽如螺旋。漸至殞命。而它因食獸肉。手濯不虞之害者。更數見不鮮。如破傷風鼠疫喉脫疽結核菌等。均可由肉食而致。爲害尤多。再考吾人飲蛋白質之食物。在乎攝取滋養素。而滋養素中所含之成分。除蛋白質炭水化合物的外。尚有最要之維他命 Vitamin 之存在。而含有維他命最富者。厥爲植物與果類。維他命一名生活素。爲吾人生活上不可或缺之一要物。而動物類除肝腦之外。皆無維他命。然吾人有維他命則生。缺維他命則死。所以人類專食動物。則生命必起障礙。若僅喫蔬果。則生命反可延長。昔有航行者。僅恃獸肉以爲食。未幾。全舟之人。悉患瘧血病。此其明證。故吾人攝取

(十一)
(姚夢石)

<p>【名稱】新紅膏</p> <p>【效能】治沿皮蛇頭瘡癰疔</p> <p>【藥品用量及製法】</p> <p>松香紫紅各四兩香油八兩</p> <p>先將油熬乾數沸。入藥攪勻成膏</p> <p>【用法】攤貼</p> <p>【名稱】玉紅膏</p> <p>【效能】治爛疔尤驗</p> <p>【藥物用量及製法】</p> <p>杏仁明礬東丹各等分各研末用</p> <p>飯油打成膏</p> <p>用法攤紙上作夾層刺孔貼之</p>							
---	--	--	--	--	--	--	--

治瘋犬咬傷之經

驗方
楊舒榮

婦人懷孕。則月經停止。勢病亦月經停止。懷孕而
兼子嗽。頗似勢病。勢病而兼腹脹。頗似懷孕。更
有懷孕食少形瘦而類勢。勢病氣逆泛嘔而似孕。辨
若不明。治必有誤。壽域黃泉。相距咫尺。可不慎
哉。爰將兩者之辦法。分述于下。以供家庭之實用
焉。

(辨)二面色 懷孕而面色紅潤光澤。或略置淡黃色。
勢病而面色桃白枯槁。或兩頰紅赤。

(二)辨舌苔 懷孕則舌上略有薄苔。捫之潤澤。勢
病則舌上光絳。捫之乾澀。

(三)辨乳頭 懷孕則乳房漸膨。乳頭呈紅褐色。勢

婦女懷孕與勞病之辨

別注
張又良

婦人懷孕。則月經停止。勞病亦月經停止。懷孕而
兼子嗽。頗似勞病。勞病而兼腹脹。頗似懷孕。更
有懷孕食少形瘦而類勞。勞病氣逆泛嘔而似孕。辨
若不明。治必有誤。壽域黃泉。相距咫尺。可不慎
哉。爰將兩者之辦法。分述于下。以供家庭之實用
焉。

(辨一)面色 懷孕面色紅潤光澤。或略置淡黃色。
勞病面色皸白枯槁。或兩頰紅赤。

(二)辨舌苔 懷孕則舌上略有薄苔。捫之潤澤。勞
病則舌上光絳。捫之乾澀。

(三)辨乳頭 懷孕則乳房漸膨。乳頭呈紅褐色。勞
病則乳房乾縮。乳頭呈灰白色。

(四)辨腹部 懷孕三四月之後。腹中漸覺動躍。勞
病三四月之後。腹中毫無動躍。

(五)辨症候 懷孕無潮熱盜汗。肌膚甲錯等症。勞
病有潮熱盜汗。肌膚甲錯等症。

(六)辨脈象 懷孕之脈。必弦搏陽別。兩關滑甚。
勞病之脈。必弦細扎數。兩尺虛甚。

售經局書福幸

新垣時病論	何廉臣	四冊	七角
中西合纂外科大全	顧鳴盛	二冊	一元〇八分
中西合纂婦科大全	顧鳴盛	二冊	一元〇八分
中西合纂幼科大全	顧鳴盛	二冊	一元〇八分
兒科診斷學	何廉臣	二冊	四角八分
古今名醫萬方類編	何廉臣	八冊	二元二角八分
全國名醫驗案類編	何廉臣	八冊	四元八角

(張治河)

一爲最毒過盛而無制。一爲正氣虛弱而不支。毒過盛者。多起充血變化。如痘色紫黑。周身熱壯。而脈氣粗。口渴煩躁。使閉漫紅。唇焦舌赤。脈象洪大等是。宜用白虎承氣等湯。通利大便。以殺其勢。正氣虛者。多起貧血變化。如痘色灰白。面色慘淡。精神疲倦。大便溏瀉。唇舌色白。脈象沉細等是。宜用保元八珍等方。激腦強心。以助其抗毒能力。又有外寒刺激太甚。肌腠縮緊者。則宜麻桂升柴等方。以啓發毛竅。舒張血管。使腐爛大開。膿濁可以暢泄。

【調攝】

患本症者。宜令靜臥清涼之所。窗前蒙以紅布。禁忌羣聚。避免風寒。西醫對於發熱。多用冰奄之法。蓋不知痘毒發熱。正係毒熱乘機作用。若施冷法。是抑其外出之機也。且血管因寒而縮。則出於閉塞。病毒出不待已。必然倒戈反攻。中樞受敵。命必危矣。此法萬不可從。

半
贈

宣揚中醫起見凡寄角票六角當贈現代名醫驗案四集一部上海北四川路餘慶坊六十二號少年中醫社葉勁秋

(續)

炭酸水(百分之五)塞之。倘係齒根膿潰。當時時用微溫湯或硼酸水含漱。如無效驗。須延牙科醫生治之。

七、眼病 每日用微溫之硼酸水洗之。宜避日光。

八、喉病 初起者須用硼砂水或食用水常常含漱。重者須延延醫士治之。

九，熱病 普通治法。初起時用瀉利鹽二三錢。以開水一碗沖服。或服一次。或連服二三次。務使腹中宿垢瀉清。去其發熱之根。再用金雞納霜九。每粒約二厘者。每日服三九。或於發熱前四點鐘服之更佳。每日早晚須注意病人之體溫。用寒暑表測之則較有把握也。